



Walramstraße 3, 53175 Bonn

Tel.: 0228/261555, FAX: 0228/215885 u. 2420999

Online: <http://www.sucht.de>

E-Mail: [sucht@sucht.de](mailto:sucht@sucht.de)

## Verbrauch, Missbrauch, Abhängigkeit - Zahlen und Fakten<sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup>

<b>1. Alkoholkonsum, - missbrauch, -abhängigkeit</b>						
<b>1.1. Erwachsene Bevölkerung (18 - 59 Jahre)<sup>1)</sup> N: 8061, Ausschöpfungsquote 55 %</b>						
Konsumform: Alkohol (letzten 30 Tage) im Jahr 2003						
	2003		2003		2003	2000
	Männer (M)		Frauen (F)		Gesamt (47,2 Mio.)	Gesamt
Abstinenz (≥ 30 Tage)	-	13,0 %	-	20,9 %	16,8 % (7,9 Mio.)	13,7 %
risikoarmer Konsum	>0-30 g	70,8 %	>0-20g	71,5 %	71,1 % (33,6 Mio.)	70,6 %
riskanter Konsum	>30-60 g	12,1 %	>20-40g	6,3 %	9,3 % (4,4 Mio.)	11,3 %
gefährlicher Konsum	>60-120 g	3,7 %	>40-80g	1,2 %	2,5 % (1,1 Mio.)	3,7 %
Hochkonsum	>120 g	0,4 %	>80g	0,1 %	0,3 % (141.600)	0,7 %

Hinweis: 1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g,  
1 Liter Spirituosen 262,0 g

<b>Risikohafter Konsum und schädlicher Konsum</b>						
	Gesamt		Männer		Frauen	
riskanter oder schädlicher Konsum (Audit > 8 Punkte)	22,7 %		34,7 %		9,1 %	
riskanter oder schädlicher Konsum nach Alter (Audit ≥ 8 Punkte)	18 - 20 Jahre	21 - 24 Jahre	25 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre
	41,3 %	33,9 %	28,4 %	19,6 %	20,4 %	19,4 %

<b>Alkoholabhängig/-missbraucher<sup>2)</sup> (2000)</b>	<b>18 - 59 Jahre</b>	<b>18 - 69 Jahre</b>
Anzahl von Alkoholabhängigen	1,5 Mio. (3,1% davon Männer 5 %, Frauen 1,3 %)	1,6 Mio.
Anzahl von Alkoholmissbrauchern	ca. 2,4 Mio. (5%)	2,7 Mio.

**1.2. Alkoholkonsum Jugendlicher (12 - 25 Jahre) <sup>3)</sup> in %**

	Gesamt		Männer		Frauen	
	2001	2004	2001	2004	2001	2004
Erfahrungen mit Alkohol (Lebenszeit)	92	90	93	90	91	89
Erfahrungen mit Alkohol (letzten 12 Monate)	87	86	87	86	85	85
<b>Lebenszeit/12-Monatsprävalenz: Erfahrungen mit Alkohol (2004) nach Alter in %</b>						
	Lebenszeit - Prävalenz			12 Monate Prävalenz		
12-15 Jahre	72			66		
16-19 Jahre	97			96		
20-25 Jahre	97			93		

**Alkoholkonsum mindestens 1 mal pro Woche**

	1973 (Westdeutschland)	1986 (Westdeutschland)	1997 (Gesamt)	2001 (Gesamt)	2004 (Gesamt)
Bier davon:	48 %	39 %	26 %	22 %	22 %
Männer	64 %	58 %	41 %	34 %	35 %
Frauen	30 %	20 %	11 %	10 %	8 %
Wein davon:	24 %	14 %	10 %	9 %	7 %
Männer	23 %	12 %	6 %	8 %	6 %
Frauen	25 %	15 %	14 %	10 %	9 %
Spirituosen	20 %	5 %	5 %	4 %	5 %
Männer	25 %	8 %	8 %	6 %	7 %
Frauen	14 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Mixgetränke	-	10 %	7 %	8 %	16 %
Männer		12 %	8 %	11 %	20 %
Frauen		7 %	5 %	6 %	11 %

**Alkoholkonsum mindestens 1 mal pro Woche nach Alter (2004) in %**

	Bier	Alkoholmixgetränke	Wein	Spirituosen
12-15 Jahre	6	7	1	2
16-19 Jahre	27	24	6	7
20-25 Jahre	29	10	12	5
Gesamt (2004)	22	16	7	5
Gesamt (2001)	22	8	9	4

**Konsum von Alcopops nach Geschlecht und Alter (2004) in %**

	mindestens 1x pro Woche	1 - mehrmals im Monat
Männer	14	31
Frauen	7	32
12-15 Jahre	6	19
16-19 Jahre	16	39
20-25 Jahre	8	34
Gesamt	10	31

<b>Alkoholkonsum in g reinem Alkohol pro Woche nach Alter und Geschlecht in %</b>					
	> 120 g	1-120 g	< 1 g	Ø g Woche 2004	Ø g Woche 2001
2001	14	51	35		53,9
2004	17	52	31	68,8	
Männer	26	48	26	96,5	77,1
Frauen	8	56	36	39,2	29,3
12-15 Jahre	5	31	64	20,9	14,1
16-19 Jahre	24	61	15	97,5	65,5
20-25 Jahre	22	59	19	82,2	73,1

<b>Risikante Konsummuster - Binge-Drinking in % 5 und mehr Gläser Alkohol hintereinander getrunken haben in den letzten 30 Tagen</b>				
	an 1-2 Tagen	an 3-5 Tagen	an 6 Tagen und mehr	insgesamt
Gesamt	19	10	5	34
Männer	21	14	8	43
Frauen	17	6	2	25
12-15 Jahre	8	3	1	12
16-19 Jahre	26	12	6	46
20-25 Jahre	23	12	6	41

<b>Binge-Drinking nach Schularten in % (12-25 Jahre)</b>	
Insgesamt	34
Hauptschule	15
Realschule	19
Gymnasium (Sek1)	16
Gymnasium (Sek 2)	48
Berufsausbildung	48
Hochschule	43
Erwerbstätige	39

<b>Alkoholrauscherfahrung im letzten Jahr</b>				
12-13 Jahre	14-15 Jahre	16-17 Jahre	18-19 Jahre	Gesamt
8 %	31 %	56 %	48 %	40 %

<b>Alkoholrauscherfahrung 2001 und 2004 in %</b>			
	noch nie	im letzten Jahr	in den letzten 3 Monaten
2001	41	19	21
2004	39	16	23
Männer	36	16	29
Frauen	43	16	17
12-15 Jahre	79	9	10
16-19 Jahre	27	23	30
20-25 Jahre	20	17	28

<b>Häufigkeit von Alkoholräuschen in % (2004)</b>			
	1 - 2 mal	3 - 5 mal	6 mal und mehr
insgesamt	22	17	21
Männer	19	17	28
Frauen	26	17	14
12-15 Jahre	13	5	3
16-19 Jahre	34	20	19
20-25 Jahre	23	22	35

<b>Alkohol-Trinkmotive (in %) (12-25 Jahre)</b>		
	Gesamt	mit Binge-Drinking (letzten 30 Tage)
Alkohol sorgt für gute Stimmung, wenn man mit anderen zusammen ist	67	86
Alkohol in Maßen fördert die Gesundheit	34	40
Wenn man aus sich herausgehen möchte, sollte man Alkohol trinken	32	45
Alkohol gehört dazu, wenn man das Leben genießen will	22	33
Wenn man deprimiert ist, helfen 1 - 2 Gläser Alkohol	13	18
Nach einem anstrengenden Tag schafft Alkohol die richtige Entspannung	12	15
Wenn man alleine ist, kann man mit Alkohol gut die Langeweile vertreiben	3	4

### **1.3. Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen <sup>4)</sup>**

Mortalität pro Jahr	42.000
Volkswirtschaftliche Kosten alkoholbezogener Krankheiten (ohne Kriminalität und intangible Kosten)	ca. 20 Mrd.
Arbeitsunfähigkeitsfälle	850.000
Krankenhausaufenthalte (10 - 15 %) davon diagnostiziert (1997)	570.000
- Alkoholabhängigkeit	177.500
- Alkoholpsychose	36.000
- Alkoholvergiftung	8.000
Rehabilitationsmaßnahmen	40.000
Frühberentungen	5.000
Straftaten unter Alkoholeinfluss:	
Gefährliche oder schwere Körperverletzung	96.000
Vergewaltigung und sexuelle Nötigung	6.000
Tötungsdelikte	2.000

<b>1.4. Alkoholunfälle im Straßenverkehr (ab 0,3 Promille Blutalkohol): 2001-2004 <sup>4)</sup></b>				
Jahr	2001	2002	2003	2004
mit Personenschaden: (Anteil Frauen ca. 12 %)	25.690	25.333	24.245	22.548
dabei getötete	909	932	817	704
häufigste Altersgruppe bei Unfällen mit Personenschäden	21 - 24 Jahre (Männer)			

<b>1.5. Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner im Jahr 1999/2000/2001/2002/2003/2004 <sup>4)</sup></b>						
	2004 <sup>a)</sup>	2003	2002	2001	2000	1999
Bierkonsum	115,8	117,5 Liter	121,5 Liter	122,4 Liter	125,5 Liter	127,5 Liter
Weinkonsum	20,1	19,8 Liter	20,3 Liter	19,8 Liter	19,0 Liter	18,0 Liter
Schaumwein	3,8	3,8 Liter	3,9 Liter	4,2 Liter	4,1 Liter	4,9 Liter
Spirituosenkonsum	5,8	5,9 Liter	5,9 Liter	5,8 Liter	5,8 Liter	5,9 Liter
pro Kopf Verbrauch Alkohol in Litern	145,5	147 Liter	151,6 Liter	152,8 Liter	154,4 Liter	156,3 Liter
pro Kopf-Verbrauch von reinem Alkohol	10,1	10,2 Liter	10,4 Liter	10,4 Liter	10,5 Liter	10,6 Liter
Einnahmen an alkoholbezogenen Steuern	3,445 Mrd. Euro	3,450 Mrd. Euro	3,411 Mrd. Euro	3,459 Mrd. Euro	3,507 Mrd. Euro	3,660 Mrd. Euro
Werbeausgaben für alkoholische Getränke	526 Mio. Euro	525 Mio. Euro	560 Mio. Euro	575 Mio. Euro	597 Mio. Euro	555 Mio. Euro

a) vorläufig

<b>1.6. Rangfolge ausgewählter Länder: Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2003 <sup>4)</sup></b>	
1. Luxemburg	12,6 Liter
2. Ungarn	11,4 Liter
3. Tschechien	11,0 Liter
4. Irland	10,8 Liter
5. Deutschland	10,2 Liter
6. Spanien	10,0 Liter
7. Großbritannien	9,6 Liter
8. Portugal	9,6 Liter
9. Dänemark	9,5 Liter
10. Frankreich	9,3 Liter

<b>1.7. Werbeaufwendungen (in Mio. Euro)</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Bier	364	336	347	360	388	380
Spirituosen	97	118	132	134	125	110
Sekt	45	48	54	46	54	42
Wein	20	24	27	35	31	21
Gesamt	526	525	560	575	597	555

<b>1.8. Alkoholsteuern (in Mio. Euro)</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Biersteuer	787	786	812	828	844	846
Schaumweinsteuer	436	432	420	457	478	546
Branntweinsteuer	2.222	2.232	2.149	2.143	2.151	2.233
Gesamt	3.445	3.450	3.381	3.428	3.472	3.625

<b>1.9. Krankenhausdiagnosestatistik 1997 Stationäre Behandlungsfälle im Krankenhaus (Minimalschätzung)</b>			
	<b>Männer</b>	<b>Frauen</b>	<b>Gesamt</b>
- aufgrund von Alkohol	3,4 %	0,9 %	2,0 %
- aufgrund von Tabak	5,7 %	1,4 %	3,5 %
- Behandlungskosten (Alkohol/Tabak)	2,7 Mrd. Euro		

<b>2. Tabakkonsum</b>				
<b>2.1. Zigarettenkonsum (in Stück) <sup>4)</sup></b>				
<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>
111,7 Mrd. (-15,8 %)	ca. 132,6 Mrd.	ca. 142,5 mMrd.	ca. 142,5 Mrd.	ca. 139,6 Mrd.

<b>Einnahmen Tabaksteuern in 2000 - 2004 (in Mio. Euro)</b>					
	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>
Zigaretten	12.540	13.353	13.205	11.432	10.886
Zigarillos/Zigarren	56	45	46	39	37
Feinschnitt	1.007	676	514	570	489
Pfeifentabak	23	21	21	22	23
Gesamt	13.626	14.095	13.771	12.063	11.436

<b>Ausgaben für Tabak in 1999 - 2004 (in Mio. Euro)</b>						
	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Zigaretten	19.961	21.078	21.578	19.861	19.176	19.579
Zigarillos/Zigarren	653	569	566	499	507	469
Feinschnitt	2.217	1.472	1.058	1.140	990	923
Pfeifentabak	94	91	86	95	92	98
Gesamt	22.925	23.209	23.285	21.595	20.765	21.069

<b>Ausgaben für Tabakwerbung (in Mio. Euro)</b>	
	<b>2004</b>
- Printmedien (einschließlich der Diversifikationsprodukte wie z.B. Schuhwerbung, Reisewerbung von Zigarettenherstellern)	55
- Kino	26
- Außenwerbung	118
- Sponsoring	102

<b>Todesfolge</b>		
Tabakbedingte Todesfälle (nach R. Peto 1994)	gesamt:	110.000-140.000
<u>davon:</u>	Männer	95.000
	Frauen	16.200

<b>Kosten tabakbedingter Krankheiten und Todesfälle (1993)</b>
17,3 Mrd. Euro

<b>Todesursachen:</b>		
	Krebs	43.000
	Kreislaufkrankungen	37.000
	Atemwegserkrankungen	20.000

<b>2.2. Raucheranteil Erwachsene (18 - 59 Jahre) <sup>1) 2)</sup></b>			
	<b>1997</b>	<b>2000</b>	<b>2003</b>
Gesamt	17,8 Mio.	16,6 Mio.	16,0 Mio. (33,9 %)
Männer	43 %	39 %	37,1 %
Frauen	30 %	31 %	30,5 %
<b>Starke Raucher (20 Zigaretten und mehr)</b>			
	<b>1997</b>	<b>2000</b>	<b>2003</b>
Gesamt	6,7 Mio.	5,8 Mio. (35 % der Raucher)	5,7 Mio. (35,6 % der Raucher, davon 41,6 % Männer; 28,6 % Frauen)
<b>Abhängigkeit nach Fagerström (18 - 59 Jahre): ca. 5,8 Mio. (36,9 % der Raucher/innen (2003) )</b>			
Anteil der abhängigen Raucher/innen	<b>Männer</b>		<b>Frauen</b>
	40,0 %		31,9 %

<b>Passivrauchen von Nichtrauchern (Bundesgesundheitsurvey)</b>	<b>Repräsentativerhebung 2003 (fast) täglich</b>	
- Passivrauchbelastung am Arbeitsplatz	21 %	26,8 %
- Passivrauchen zu Hause	13 %	9,3 %
- Passivrauchen an anderen Orten	43 %	
- Gesamt	55 %	

<b>Ausstiegsversuche (INRA-Studie 1999)</b>	
- EU-Durchschnitt	55 %
- Deutschland	43 %
- davon Männer	39 %
- davon Frauen	47 %

<b>Benutzte Hilfsmittel, um mit dem Rauchen aufzuhören</b>	
Entwöhnungskurs oder Seminar	0,8 %
Nikotinpflaster	9,1 %
Nikotinkaugummi	7,6 %
Bücher, CD etc.	10,9 %
Hypnose	0,2 %
Akupunktur, Akupressur	1,7 %
Unterstützung durch Partner etc.	17,7 %
Andere Hilfsmittel	6,2 %
Keine Hilfsmittel	62,0 %

**2.3 Raucheranteil Jugendliche (12 - 25 Jahre) <sup>3)</sup> 2004 Lebenszeit-Prävalenz**

		Geschlecht			
Männer		68 %			
Frauen		65 %			
Gesamt		66 %			
Ø Alter: erste Zigarette 13,6 Jahre		Ø Alter: tägliches Rauchen 15,6 Jahre			
<b>Raucherquote in %</b>	12 - 15 Jahre	16 - 19 Jahre	20 - 25 Jahre	Gesamt	
Raucher	41	74	78	66	
davon ständige Raucher	5	26	30	21	
<b>Starke Raucher (20 Zigaretten und mehr pro Tag) 2004 in %</b>					
Gesamt	Männer	Frauen	12-15 Jahre	16-19 Jahre	20-25 Jahre
12	13	12	4	7	17
<b>Raucheranteil 2004</b>					
	<b>1997</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>		
12-18 Jahre	28 %	28 %	23 %		
18-25 Jahre	51 %	45 %	44 %		
<b>Starke Raucher (20 Zigaretten und mehr) pro Tag</b>					
	<b>1997</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>		
Gesamt	28 %	19 %	12 %		
Männer	34 %	24 %	13 %		
Frauen	22 %	13 %	12 %		
<b>Raucherquote im Zeitverlauf in % Ständige und gelegentliche Raucher</b>					
<b>1973</b>	<b>1986</b>	<b>1997</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>	
58	45	41	37	35	
<b>Bereitschaft aufzuhören (nächsten 6 Monate) 2004 in % (12-25 Jahre)</b>					
Gesamt	Männer	Frauen	12-15 Jahre	16-19 Jahre	20-25 Jahre
64	63	65	74	65	63
<b>Absicht aufzuhören (nächsten 30 Tagen) 2004 in % (12-25 Jahre)</b>					
Gesamt	Männer	Frauen	12-15 Jahre	16-19 Jahre	20-25 Jahre
29	31	27	39	29	29

<b>Aufhörversuche in % 2004 (12-25 Jahre)</b>		
Gesamt	einmal	mehrmals
28	29	43
<b>Aufhören fällt (sehr) schwer in % 2004</b>		
Männer		66
Frauen		65
12-15 Jahre		61
16-19 Jahre		67
20-25 Jahre		66

<b>Raucheranteil und Schultyp in % (2004)</b>	
Raucherquote 12-25 Jahre	35
Haupt-, Realschule	22
Gymnasium (Sek. I)	15
Gymnasium (Sek. II)	38
Berufsschule	52
Erwerbstätige	47
Hochschule	34

<b>Gründe für das Rauchen in % 2004</b>	
Rauchen steckt an, wenn man mit anderen zusammen ist	52 %
beruhigt	46 %
schafft Wohlbefinden	33 %
es macht Spaß mit Freunden zu rauchen	29 %
kann man nicht ablenken	27 %
hält schlank	26 %
hilft, schwierige Situationen zu überstehen	24 %
schmeckt	20 %
bewirkt Konzentration	11 %
macht sympathisch	3 %

<b>3. Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential (18 - 59 Jahre)</b>	
<b>3.1. Medikamentenabhängigkeit (DSM IV) 1,3 - 1,4 Mio. (2,9 %) <sup>1)4)</sup></b>	
davon: Männer	610.000(2,5 %)
Frauen	750.000 (3,2 %)
Nach Schätzungen aus Krankenkassendaten sind ca. 1,1 Mio. abhängig von Benzodiazepinderivaten, ca. 300.000 abhängig von anderen Arzneimitteln (Glaeske, 2002)	
4-5 % aller verordneten Arzneimittel besitzen ein eigenes Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential (u.a. Schlaf- und Beruhigungsmittel (Tranquilizer) mit Wirkstoff aus der Familie der Benzodiazepine, Antidepressiva, kodeinhaltige Schmerzmittel). Rund 25 - 30 % dieser Mittel wird langfristig zur Suchtunterhaltung und zur Vermeidung von Entzugserscheinungen verordnet.	
<b>Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	
Anzahl der verkauften Packungen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln	32,3 Mio.
- davon pflanzliche Mittel (Anteil)	39 %
Industrieumsatz in Mio. €	136
Apothekenumsatz in Mio. €	300

**3.2. Prävalenz der häufigen Einnahme von Medikamenten mit psychoaktiven Wirkungen (in den letzten 30 Tagen zumindest einmalige Einnahme pro Woche) (Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Abführmittel, Appetitzügler) (2003)<sup>1)</sup> in %**

	Gesamt	Schmerzmittel	Beruhigungsmittel	Antidepressiva	Schlafmittel	Anregungsmittel	Appetitzügler	Neuroleptika
Männer	13,3 %	10,6 %	1,7 %	1,5 %	1,4 %	0,5 %	0,3 %	0,8 %
Frauen	20,4 %	15,6 %	2,4 %	3,4 %	2,3 %	0,3 %	0,7 %	0,9 %
Gesamt	16,8 %	13,1 %	2,0 %	2,4 %	1,9 %	0,4 %	0,5 %	0,8 %

**Altersgruppen: mindestens 1 Medikament mit psychoaktiver Wirkung pro Woche (letzten 30 Tage)**

Gesamt	18-20 J.	21-24 J.	25-29 J.	30-39 J.	40-49 J.	50-59 J.
16,8 %	12,5 %	11,6 %	11,8 %	14,4 %	17,3 %	24,6 %

**Problematischer Medikamentenkonsum<sup>1)</sup> (KFM ≥ 4) in %**

Gesamt	Männer	Frauen	18 - 20 J	21 - 24 J	25 - 29 J	30 - 39 J	40 - 49 J	50 - 59 J
4,3 (2,03 Mio.)	3,2	5,5	2,9	2,8	2,5	3,3	3,6	8,5

**4. Konsum illegaler Drogen**

**4.1. Konsum illegaler Drogen bei Jugendlichen (12 - 25 Jahre)<sup>3)</sup> 2001 2004**

- Erfahrungen mit illegalen Drogen (insgesamt)	27 %	32 %
- mit Cannabis	26 %	Gesamt: 31 % M: 36 % F: 27 %
- mit Ecstasy	4 %	4 %
- mit Amphetaminen	2 %	4 %
- Psychoaktive Pflanzen/Pilze		4 %
- mit LSD	2 %	2 %
- mit Kokain	2 %	2 %
- mit Schnüffelstoffen	1 %	1 %
- mit Heroin	0,3 %	0,3 %
- mit Crack	0,2 %	0,2 %
- mit anderen Rauschmitteln	3 %	-

<b>Illegale Drogen - Konsum in %</b>				
	2001 Lebenszeit	2001 Letzten 12 Monate	2004 Letzten 12 Monate	
12-13 Jahre	1	1	12 - 15 Jahre	5 %
14-15 Jahre	12	7		
16-17 Jahre	29	21	16 -19 Jahre	20 %
18-19 Jahre	38	18		
20-21 Jahre	34	15	20 - 25 Jahre	15 %
22-23 Jahre	38	16		
24-25 Jahre	36	12		
Gesamt	27	13	Gesamt	13 % M: 17 % F: 10 %
- Ø Alter der ersten Erfahrung: (2004)				ca. 17 Jahre

<b>Gegenwärtiger Drogenkonsum in % 2004</b>		
	<b>illegale Drogen</b>	<b>Cannabis</b>
12-15 Jahre	1	1
16-19 Jahre	6	6
20-25 Jahre	5	6
Gesamt	5 (M: 6, F: 4)	5 (M: 6, F: 3)

<b>Regelmäßiger Drogenkonsum (&gt; 10 mal im letzten Jahr) in % 2004</b>		
	<b>illegale Drogen</b>	<b>Cannabis</b>
12-15 Jahre	1	1
16-19 Jahre	4	3
20-25 Jahre	4	4
Gesamt	3 (M: 5, F: 2)	3 (M: 5, F: 1)

<b>Alter bei erster Erfahrung (in Jahren)</b>			
Jahr	2004	2001	1993
Cannabis	16,4	16,5	17,5
Ecstasy	17,3	17,4	-
Amphetamine	17,1	17,6	17,2
andere Rauschmittel	-	17,4	18,3
LSD	17,6	17,3	17,5
Kokain	18,0	18,4	17,3
Schnüffelstoffe	16,4	15,0	15,3
Heroin	-	17,3	-
Crack	-	17,4	-
Psychoaktive Pflanzen/Pilze	17,3		
- Aufhören nach 1 - 2maligen Probieren			45 %

<b>Erfahrungen mit illegalen Drogen (Lebenszeit)</b>				
	1993	1997	2001	2004
Gesamt	18 %	23 %	27 %	32 %
n BL	6 %	18 %	24 %	-
a BL	21 %	24 %	28 %	-

<b>Drogenerfahrung (letzten 12 Monate)</b>				
	1993	1997	2001	2004
12 - 25 Jahre	11 %	12 %	13 %	13 %
12 - 17 Jahre	5 %	10 %	10 %	?

<b>Aktueller Konsum % (ab 1993 einschließlich neue Bundesländer)</b>						
	1973	1986	1993	1997	2001	2004
Männer	8	5	10	11	6	6
Frauen	3	3	4	8	4	4

<b>Drogenangebot erhalten haben in %</b>			
1993	1997	2001	2004
35 %	41 %	48 %	49 %

<b>Ablehnung illegaler Drogen: „Nehme ich auf keinen Fall“ in %</b>				
1973	1986	1993	2001	2004
41 %	66 %	60 %	53 %	50 %

<b>Probierbereitschaft (*nur in Westdeutschland) in %</b>					
	1989*	1993	1997	2001	2004
Haschisch	21	26	27	44	47
Ecstasy	2	4	13	12	8
Amphetamine	4	6	7	11	10
LSD	3	3	4	6	5
Kokain	4	5	3	6	6
Heroin	3	2	1	3	4

<b>Keine Probierbereitschaft: Drogenerfahrene und - unerfahrene im Vergleich in % („Sollte man auf keinen Fall nehmen“) 2004</b>		
	Drogenerfahrene	Drogenunerfahrene
Haschisch	22	67
Ecstasy	88	92
Amphetamine	88	89
LSD	93	94
Kokain	91	94
Heroin	96	96

<b>Gründe für die Ablehnung von Drogen in %</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>
Kein Interesse	45	43
Angst vor gesundheitlichen Schäden	26	19
Angst vor Sucht	26	20
Unsicherheit/Angst vor Rausch	16	19
Lehne Drogen ab	-	9
Nichtraucher/in	5	5
Schlechtes Ansehen von Drogenkonsumenten	5	9
Angst vor Eltern, Bekanntwerden in Schule/Betrieb	3	6
Angst vor Strafverfolgung	3	6
zu teuer	1	3

<b>Gesundheitsbewusstsein und Substanzkonsum (in %) 2004</b>		
	Gesundheitsbewusste (46 %)	wenig Gesundheitsbewusste
Cannabiskonsum (letzten 12 Monate)	9 %	17 %
Es würden Cannabis vielleicht einmal versuchen	43 %	50 %

<b>Wirkungserwartung nach Geschlecht (in %) 2004</b>			
	Gesamt	M	F
Drogen verschaffen Glücksgefühle	46	51	43
Mit Drogen kann man Hemmungen überwinden	40	43	37
Mit Drogen erreicht man, dass man alles viel stärker erlebt	30	33	29
Mit Drogen kann man gut entspannen	26	30	22
Drogen helfen, Probleme des Alltags zu vergessen	22	23	21
Es macht Spaß, mit Freunden Drogen zu nehmen	15	18	12
Wer Drogen nimmt, lernt sich besser kennen	6	7	5

**4.2. Konsum illegaler Drogen bei Erwachsenen <sup>1)2)</sup> (2000 und 2003) 18-59 Jahre**

Missbrauch und Abhängigkeit von illegalen Drogen (12 Monate, nach DSM IV) 18-59 Jahre (in %) 2000 <sup>2)</sup>

	Gesamt	Männer	Frauen	18-20 Jahre	21-24 Jahre
DSM IV Missbrauch	0,3	0,5	0,1	1,6	1,2
DSM IV Abhängigkeit	0,6	0,9	0,4	3,7	3,0

Prävalenz des Konsums (in %) 2003 <sup>1)</sup>	Gesamt	Männer (W)	Frauen (W)
- Erfahrungen mit illegalen Drogen (18-59 Jahre, Lebenszeit)	25,2 % (11,9 Mio.)	31,3 %	18,9 %
- Erfahrungen in den letzten 12 Monaten	7,4 % (3,5 Mio.)	9,6 %	5,0 %
- Erfahrungen in den letzten 30 Tagen	3,9 % (1,8 Mio.)	5,3 %	2,3 %

**4.2.1 Lebenszeitprävalenz Konsum illegaler Drogen (2003) <sup>1)</sup>**

Lebenszeit	Gesamt	Männer	Frauen	18 - 20 J	21 - 24 J	25 - 29 J
Cannabis	24,5	30,5	18,7	40,5	44,2	38,9
Andere Drogen als Cannabis	7,1	8,9	5,1	12,3	13,0	11,9
Amphetamine	3,4	4,4	2,3	5,4	6,3	6,4
Ecstasy	2,4	3,2	1,7	6,3	6,3	6,1
LSD	2,5	3,2	1,7	2,2	3,8	3,5
Heroin	0,6	0,8	0,3	0,4	1,0	0,8
Methadon	0,3	0,5	0,1	0,6	0,3	0,4
Andere Opiate	1,2	1,6	0,8	0,7	1,8	1,8
Kokain	3,1	4,2	2,0	3,9	4,8	5,8
Crack	0,4	0,8	0,1	0,4	0,6	0,4
Pilze	2,7	3,5	2,0	7,1	6,1	5,4

**4.2.2 12 Monatsprävalenz illegaler Drogen (2003) <sup>1)</sup>**

12 Monate	Gesamt	Männer	Frauen	18 - 20 J	21 - 24 J	25 - 29 J
Cannabis	6,9	9,1	4,7	24,2	21,1	13,5
Andere Drogen als Cannabis	2,1	3,0	1,0	7,9	5,3	4,4
Amphetamine	0,9	1,3	0,5	4,2	2,6	2,2
Ecstasy	0,8	1,2	0,3	2,5	1,9	1,9
LSD	0,7	0,4	0,1	0,4	0,8	0,4
Heroin	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,3
Methadon	0,2	0,2	0,1	0,6	0,1	0,2
Andere Opiate	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,3
Kokain	1,0	1,4	0,5	2,4	1,8	1,9
Crack	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1
Pilze	0,6	0,9	0,2	4,0	2,2	1,5

**4.2.3 30 Tageprävalenz illegaler Drogen (2003) <sup>1)</sup>**

30 Tage	Gesamt	Männer	Frauen	18 - 20 J	21 - 24 J	25 - 29 J
Cannabis	3,4	4,7	2,1	14,3	10,8	7,3
Andere Drogen als Cannabis	0,9	1,5	0,4	4,1	2,7	2,0
Amphetamine	0,4	0,6	0,2	2,0	1,3	1,0
Ecstasy	0,2	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6
LSD	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1
Heroin	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3
Methadon	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
Andere Opiate	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1
Kokain	0,4	0,6	0,1	1,1	0,5	0,9
Crack	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilze	0,1	0,3	0,0	1,0	0,2	0,5

**4.2.4 Cannabisabhängigkeit (Severity of Dependence Skala, bei  $\geq 3$  Punkten) 2003 (in %, letzten 12 Monate) <sup>1)</sup>**

	Gesamt	Männer	Frauen	18 - 20 J	21 - 24 J	25 - 29 J
Gesamtstichprobe	1,1 (519.200)	1,7	0,4	5,2	3,3	2,1
Konsumentenanteil	15,7	18,7	9,7	21,5	15,9	15,4

**4.2.5 Kokainabhängigkeit (Severity of Dependence Skala, bei  $\geq 3$  Punkten) 2003  
(in %; letzten 12 Monate)**

	Gesamt	Männer	Frauen	18 - 20 J	21 - 24 J	25 - 29 J
Gesamtstichprobe	0,1 (47.200)	0,2	0,0	0,2	0,2	0,6
Konsumentenanteil	15,9	17,0	0,0	7,6	11,7	33,2

**4.3 Konsumenten harter Drogen <sup>6)</sup>**

Konsumenten harter Drogen	250.000 - 300.000
davon: drogenabhängige Personen (mindestens 100 Mal in letzten 12 Monaten Konsum harter Drogen)	ca. 100.000 - 150.000
Anzahl der Cannabis-Konsumenten:	ca. 2,1 Mio.
regelmäßige Konsumenten (20-30 mal in den letzten 30 Tagen)	ca. 270.000

**4.4 Rauschgiftdelikte <sup>4) 5)</sup> 1999 - 2004**

	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Rauschgiftdelikte (Verstöße gegen BTMG)	283.708	255.575	246.518	244.336	226.563	216.682
davon beziehen sich auf Cannabis						ca. 50 %

**4.5 Anteil an Rauschgiftkriminalität <sup>4) 5)</sup>**

	1999	1998
Anteil von Konsumenten harter Drogen an der Rauschgiftkriminalität	35 %	35,2 %

**4.6. Rauschgiftsicherstellungen <sup>4) 5)</sup>**

	2000	2001	2002	2003	2004
Heroin	796 kg (0 %)	836 kg (+ 5 %)	519,6 kg (- 37,8 %)	626 kg (+ 21 %)	775 kg (+ 8 %)
Kokain	913,4 kg (- 53,8 %)	1.288 kg (+ 41 %)	2.135,7 kg (+ 65,8 %)	1.009 kg (- 53 %)	969 kg (- 4 %)
Crack	2,2 kg	2,1 kg	7,2 kg (+ 242,9 %)	5 kg (- 31 %)	2,5 kg (- 50 %)
Amphetamin	ca. 271,2 kg (- 24,7 %)	263 kg	361,7 kg (+ 37,8 %)	484 kg (+ 34 %)	556 kg (+ 15 %)
Ecstasy	1,63 Mio. Tabletten (+ 11,2 %)	4,58 Mio. Tabl. (+ 180 %)	3,21 Mio. Tabl. (- 29,9 %)	1,26 Mio. Tabl. (- 61 %)	2,05 Mio. Tabl. (+ 63 %)
LSD	43.924 Einheiten	11.441 Einheiten	30.144 Einheiten (+ 163,5 %)		
Cannabis/ Marihuana	14,4 t	8,9 t	11,1 t	10,9 t	10,9 t

<b>4.7 Rauschgiftkonsum</b>	<b>Zahl der erstaußälligen Konsumenten harter Drogen 2000 - 2004</b>				
	2000	2001	2002	2003	2004
Zahl der erstaußälligen Konsumenten harter Drogen:	22.584	22.551	20.230	17.936	21.100 (+ 18 %) davon: 12.814 männlich 2.415 weiblich

Durchschnittliches Alter erstaußälliger Konsumenten harter Drogen:	ca. 25 Jahre
--	--------------

<b>4.8. Todesfolge <sup>4) 5)</sup></b>			
Rauschgifttote 1997	(- 12,3 % gegenüber 1996)	1.501	Personen
Rauschgifttote 1998	(+ 11,5 % gegenüber 1997)	1.674	Personen
Rauschgifttote 1999	(+ 8,2% gegenüber 1998)	1.812	Personen
Rauschgifttote 2000	(+ 12,0 % gegenüber 1999)	2.030	Personen
Rauschgifttote 2001	(- 9,6 % gegenüber 2000)	1.835	Personen
Rauschgifttote 2002	(- 17,5 % gegenüber 2001)	1.513	Personen
Rauschgifttote 2003	(- 2,4 % gegenüber 2002)	1.477	Personen
Rauschgifttote 2004	(- 6,0 % gegenüber 2003)	1.385	Personen

Von den Rauschgifttoten 2004 starben nur 19 Personen in den neuen Bundesländern. Es waren 85 % der Rauschgifttoten männlichen und 15 % weiblichen Geschlechts. Todesursächlich im Jahr 2000 waren Überdosierungen mit Heroin bzw. Mischintoxikationen in ca. 80 % der Todesfälle, 460 Drogentodesfälle (25 %) standen im Zusammenhang mit Substitutionsmitteln.

<b>5. Pathologisches Glücksspiel <sup>4)</sup></b>			
5.1 Einnahmen des Staates aus Vergnügungs-, Umsatz- und Gewerbesteuern der Unterhaltungsautomatenwirtschaft (ohne Geldspielautomaten) in Mrd. Euro			
<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
4,59 Mrd. Euro	4,46 Mrd. Euro	4,39 Mrd. Euro	4,17 Mrd. Euro
5.2 Gesamtumsatz auf dem Glücksspielmarkt (Mrd. Euro)			
<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
27,8 Mrd. Euro	27,4 Mrd. Euro	27,5 Mrd. Euro	27,4 Mrd. Euro
davon durch Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen/Gaststätten			
<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
5,65 Mrd. Euro	5,71 Mrd. Euro	5,78 Mrd. Euro	5,83 Mrd. Euro
in Spielbanken			
<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
11.085 Mio. Euro	10.902 Mio. Euro	11.110 Mio. Euro	10.510 Mio. Euro
5.3 Anzahl Pathologischer Glücksspieler an Geldspielautomaten ((Schätzung)		zwischen 25.000 und 30.000 Personen	

---

## Literaturquellen:

- 1) Kraus, L., Augustin, R.: Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey 2003: Sucht, Jahrgang 51, Sonderheft 1, März 2005
- 2) Repräsentativerhebung des Instituts für Therapieforschung (IFT) über den Konsum psychoaktiver Substanzen in der erwachsenen Bevölkerung von 18 bis 59 Jahren, München 2001  
Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland 1997, Sucht, 44. Jahrgang, Sonderheft 1, September 1998
- 3) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2001, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln 2001  
Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2004, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Teilband Alkohol, Teilband Illegale Drogen, Köln 2004
- 4) Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2000, Geesthacht 1999, ISBN 3-87581-200-X  
Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2001, Geesthacht 2000, ISBN 3-87581-207-7  
Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2002, Geesthacht 2001, ISBN 3-87581-217-4  
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2003, ISBN 3-87581-230-1, Geesthacht 2003  
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2004, ISBN 3-87581-240-9, Geesthacht 2003  
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2005, ISBN 3-87581-250-6, Geesthacht 2005  
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2006, ISBN 3-87581-260-3, Geesthacht 2006
- 5) Sucht- und Drogenbericht, hrsg. von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Berlin 2001  
Sucht- und Drogenbericht, hrsg. von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Berlin 2002  
Sucht- und Drogenbericht, hrsg. von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Berlin 2003
- 6) Schätzverfahren und Schätzungen 1997 zum Umfang der Drogenproblematik in Deutschland, Sucht, 43. Jahrgang, Sonderheft 2, Dezember 1997

---

**Hinweis:** Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt aus obigen Quellen zusammengestellt. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben etc. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie durch den Fachverband Sucht e.V. Jegliche Verantwortung und Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten werden ausgeschlossen.